

POINTS À RETENIR POUR LA PRATIQUE CLINIQUE

Pathologies
ophtalmologiques

Troubles de la vision

- Plus de 50% des PPT21 présentent un trouble de l'accommodation qui doit être dépisté par rétinoscopie dynamique et corrigé précocement pour en éviter les conséquences sur les apprentissages, notamment de la lecture et de l'écriture, induite par le trouble de la vision de près.
- Les troubles de la réfraction sont présents dans plus de 80% des PPT21. La présence d'un trouble de l'accommodation, dans plus d'un cas sur deux, impose de faire sous cycloplégie, ou sous sédation si nécessaire, une mesure objective de la réfraction sans participation accommodative.
- Typiquement, les PPT21 sont : hypermétropes dans leur jeune âge, deviennent myopes entre 7 et 10 ans et sont astigmatés tout au long de leur vie.
- L'importance de la correction de l'hypermétropie même de bas grade.
- L'importance de l'addition d'une correction de la vision de près en cas de troubles de l'accommodation par des verres à doubles foyer.
- Une diminution cliniquement significative de l'acuité visuelle est présente dans environ 45% des cas, autant chez l'enfant PT21 à partir de l'âge de 4 ans que chez l'adulte vieillissant.

- Une diminution de la vision des contrastes existe chez les enfants et les adultes vieillissants PT21.
- La déficience de l'acuité visuelle persiste malgré la correction des troubles de la réfraction et de l'accommodation par des verres correcteurs adéquats.

